

코로나19 예방접종 후 증상이 나타나면 이렇게 하세요!



코로나19 예방접종 후 최소 3일간은 특별한 증상이 나타나는지 관심을 기울여주세요.

예방접종 후 접종부위 발적, 통증, 부기, 근육통, 발열, 두통, 오한 등의
증상이 흔하게 발생할 수 있으며,
이러한 증상은 면역이 형성되는 과정에서 나타날 수 있는
반응으로 대부분 2~3일 이내 사라집니다.



접종부위에 부기나 통증이 있어요.

예방접종 후 접종부위가 붓고 아프거나 발적이 생길 수 있습니다.
이는 예방접종 후 발생 가능한 증상입니다.

접종부위 통증이 있는 경우 통증 부위에
깨끗한 수건 등으로 냉찜질을 해주세요.



접종 후 발열이 있어요.

접종 후 발열이 있을 수 있습니다.
이는 예방접종 후에 나타나는 면역반응일 가능성이 높습니다.

수분을 충분히 섭취하고 쉬어 주세요.

발열로 인해 불편함이 있는 경우에는 해열·진통제가 도움이 될 수 있습니다.



전신에 통증이 있어요.

접종 후 근육통이나 두통이 있을 수 있습니다.
예방접종 후 면역이 형성되는 과정에서 생길 수 있는 반응으로
2~3일 내 자연스럽게 호전됩니다.

일상생활에 불편함이 있다면 진통제가 도움이 될 수 있습니다.



해열·진통제를 복용하는 경우

해열·진통제 복용에 제한은 없으나 가급적 **염증을 제거하는 효과가 없는 아세트아미노펜 성분**의 의약품을 복용하시기 바랍니다.

접종 전 미리 해열·진통제를 준비하시고
증상이 나타나면 바로 복용을 하시기 바랍니다.
대부분 2~3일 이후에는 증상이 모두 사라집니다.
다만, 증상이 지속된다면 의료기관을 방문하시기 바랍니다.





이상반응이 의심되는 경우
‘예방접종 후 건강상태 확인하기’를 참고하세요.



대부분 해열·진통제 복용으로 증상이 호전되나,
3일 이상 발열이나 근육통이 지속된다면,
가까운 **의료기관을 방문**하세요.



다만, 호흡곤란, 의식소실, 안면부종 등을 동반한
심각한 알레르기 반응(아나필락시스 등)이
나타난 경우에는 즉시 **119로 연락**하거나
신속히 가까운 **응급실로 내원**하시기 바랍니다.